

Οικογένεια *Convolvulaceae*

***Ipomoea imperati* (Vahl.) Griseb.**

Συνώνυμο: *Ipomoea stolonifera* J.F.Gmel.

Γεωγραφική κατανομή: Δυτ.Κρήτη, Ιταλία, νησιά Αζόρες

Ενδημισμός:

Οικότοπος: αμμώδεις εκτάσεις

Σύντομη περιγραφή: Ετήσια ή πολυετής πόα, λεία. Βλαστοί έρποντες που συχνά ριζοβολούν στα γόνατα. Φύλλα λίγο έως πολύ σαρκώδη, έλασμα 1-5 cm, συνήθως επίμηκες ακέραιο με 3 ή 5 λοβούς, έντονα σφηνοειδές προς καρδιοειδές στη βάση, στρογγυλεμένο στο άκρο ή ακρόκοιλο ή με 2 λοβούς στην άκρη. Άνθη συνήθως μονήρη. Σέπαλα 8-15 mm, στρογγυλεμένα στο άκρο ή οξύληκτα, απεξεσμένα. Στεφάνη 35-50 mm, λευκή ή ωχροκίτρινη, μερικές φορές πορφυρή στο κέντρο.

Περίοδος ανθοφορίας: Αύγουστος-Οκτώβριος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη):

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη): Π.Δ. 67/1981

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 2337

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Turland, N.J., Chilton, L. & J.R. Press. 1993. Flora of the Cretan Area. Annotated Checklist & Atlas. The Natural History Museum. St Edmundsbury Press, Bury St. Edmunds, Suffolk, England.

Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol. 3. p. 82. Cambridge University Press.

Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί, Αθήνα. 310 σελ.