

Οικογένεια *Cruciferae* (*Brassicaceae*)

Erysimum candicum* Snogerup subsp. *candicum

Γεωγραφική κατανομή: Κρήτη και ΝΑ Κυκλάδες

Ενδημισμός: ενδημικό Νοτίου Αιγαίου

Οικότοπος: κρημνοί ασβεστούχων υποστρωμάτων (υψ. 50-1200 m)

Σύντομη περιγραφή: Μικρός, πολυετής θάμνος, με έναν κύριο βλαστό και κλαδιά που συνήθως ανθίζουν τον δεύτερο χρόνο. Τα ηλικιωμένα άτομα φτάνουν σε ύψος 25-50 cm. Φύλλα στενά λογχοειδή, με μήκος 2-12 cm, σχεδόν χωρίς μίσχο. Ταξιανθία απλή βοτρυοειδής με 5-20 άνθη. Σέπαλα πράσινα ή πρασοκίτρινα, επιμήκη προς λογχοειδή, θυλακοειδή εξωτερικά με τρισχιδείς τρίχες συνήθως στα άκρα τους. Πέταλα 19-22 mm, με «όνυχα», χνουδωτά στο κάτω μέρος, χρυσοκίτρινα ή ανοιχτοκίτρινα. Ανθήρες και νημάτια λεία. Κεράτιο επίπεδο με δυσδιάκριτη μεσσαία νεύρωση, πυκνά τριχωτό.

Περίοδος ανθοφορίας: Μάρτιος-Απρίλιος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη): Κινδυνεύει να γίνει απειλούμενο (nt) σύμφωνα με IUCN 1997

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη): Π.Δ. 67/1981

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 2523, 5396, 669, 2024, 629

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Polatschek, A. 1973. Die Vertreter der Gattung *Erysimum* auf Kreta. (The taxa of *Erysimum* represented in Crete). Ann. Mus. Goulandris 1: 113-126

Snogerup, S. 1967. Studies in the Aegean Flora VIII. *Erysimum* Sect. *Cheiranthus*. A. Taxonomy. Opera Bot. 13: 70

Strid, A. & Tan, K. (eds) 1997. Flora Hellenica. Vol. II. Koeltz Scientific

Books, Germany. 511pp.

Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί, Αθήνα. 310 σελ.