

Οικογένεια *Compositae* (*Asteraceae*)

***Inula candida* (L.) Cass.**

Συνώνυμα: *Inula candida* (L.) Cass. subsp. *candida*; *Inula limonifolia* (Sibth. & Sm.) Boiss. ex Raulin

Γεωγραφική κατανομή: Δυτ. & Κεντρ. Κρήτη, Κύθηρα

Ενδημισμός: ενδημικό Νοτίου Αιγαίου

Οικότοπος: Ασβεστολιθικά βραχώδη μέρη, σχισμές βράχων και λιθώνες, επίπεδες αργιλώδεις περιοχές (υψ. 0-800 m)

Σύντομη περιγραφή: Πολυετής, ασημόλευκος θάμνος με βλαστούς μέχρι 30 cm, λεπτούς, απλούς ή με λίγα κοντά κλαδιά στο ανώτερο 1/3 τμήμα του. Χνούδι πολύ πυκνό, λευκό. Φύλλα βάσης 3-9 cm, ωοειδή προς λογχοειδή. Κεφάλια μέτρια, με ανθίδια κιτρινωπά, πολύ μικρά, δυσδιάκριτα, που συνήθως περιβάλλονται από αρκετά βράκτια. Περίβλημα 8-9 mm, βράκτια κυρτά, συνήθως με επιμήκη άκρο.

Περίοδος ανθοφορίας: Ιούνιος-Αύγουστος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη):

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη):

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 2329, 1969

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Turland, N.J., Chilton, L. & J.R. Press. 1993. Flora of the Cretan Area. Annotated Checklist & Atlas. The Natural History Museum. St Edmundsbury Press, Bury St. Edmunds, Suffolk, England.

Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol. 4. p. 135. Cambridge University Press.

- Zaffran J., 1990. *Contributions a la Flore et la Vegetation de la Crete*. Publications de l'Universite de Provence
- Καββάδας, Δ., 1956-1964 Εικονογραφημένο Βοτανικόν Φυτολογικόν Λεξικόν. Τόμοι Ι - ΙΧ. Εκδ.Πήγασος, Αθήνα
- Κυπριωτάκης Ζ. 1998. Συμβολή στη μελέτη της χασμοφυτικής χλωρίδας της Κρήτης και προτάσεις για τη διαχείριση της ως φυσικού πόρου (φυσιολατρικός τουρισμός, ανθοκομία, εθνοβοτανική κλπ.). Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών. 230 σελ.
- Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί, Αθήνα. 310 σελ.