

Οικογένεια *Compositae* (*Asteraceae*)

***Centaurea poculatoris* Greuter**

Γεωγραφική κατανομή: ΝΔ Κρήτη

Ενδημισμός: ενδημικό Κρήτης

Οικότοπος: Σχισμές απότομων ασβεστούχων βράχων (υψ. 50-300 m).

Σύντομη περιγραφή: Πολυετές ποώδες φυτό (ημικρυπτόφυτο) με βλαστούς μήκους 3-10 cm. Φύλλα βάσης σε ροζέτα, λογχοειδή ή σπαθιδοειδή, ακέραια. Συνήθως τα ανώτερα λοβωτά ή πτεροειδή με ωοειδείς ή σφαιρικούς λοβούς, συνήθως με μικρό μίσχο, τα νεότερα με λευκωπές τρίχες και τα μεγαλύτερα σχεδόν λεία. Κεφάλια ανά 1, με ανθίδια κίτρινα με ρόδινες άκρες. Αχάινια επιμήκη, καλύπτονται με χνουδύ, πάππος λευκός αποτελούμενος από ανόμοιες σκληρές τρίχες μήκους μέχρι 3,5 mm.

Περίοδος ανθοφορίας: Απρίλιος-Μάιος (Ιούνιος, Ιούλιος)

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη): Κινδυνεύον (Ε) σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο Σπανίων & Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας (1995) - Τρωτό (V) σύμφωνα με IUCN 1997

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη): Π.Δ. 67/1981

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 5846

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol. 4. p. 275. Cambridge University Press.

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Phitos, D., Strid, A., Snogerup, S., Greuter, W. (eds) 1995. The Red Data Book of rare and threatened plants of Greece. World Wide Fund for Nature. Publish.: K. Michalas S. A. Athens. 528p.

Turland, N.J., Chilton, L. & J.R. Press. 1993. Flora of the Cretan Area. Annotated Checklist & Atlas. The Natural History Museum. St Edmundsbury Press, Bury St. Edmunds, Suffolk, England.

Γεωργίου Κ. & Δεληπέτρου Π. 2001. Απειλούμενα Ενδημικά είδη Χλωρίδας στη Νότια Ελλάδα. Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακό Ταμείο, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Greuter W. 1967. Beitrage zur Flora der Sódδgdis 8-9. Bauhinia 3:243-254

