

Οικογένεια *Scrophulariaceae*

***Chaenorhinum idaeum* Rech.f.**

Συνώνυμο: *Chaenorhinum minus* (L.) Lange subsp. *idaeum* (Rech.f.) R.Fern.

Γεωγραφική κατανομή: Κεντρ. & Ανατ.Κρήτη

Ενδημισμός: ενδημικό Κρήτης

Οικότοπος: επίπεδες αργιλώδεις εκτάσεις, πετρώδες έδαφος (υψ. 1700-2200 m)

Σύντομη περιγραφή: Μονοετές νανώδες φυτό μέχρι 5 εκ, με πολλούς διακλαδιζόμενους βλαστούς, χωρίς ένα ευδιάκριτο, κύριο βλαστό. Φύλλα γραμμοειδή προς επιμήκη-λογχοειδή, στρογγυλεμένα στο άκρο. Κάλυκας 2-2,5 mm, στεφάνη 5-9 mm με άνθη ανοιχτοκίτρινα, πλήκτρο 1,5-2,5 mm, κυλινδρικό, αμβλύ. Κάψα σχεδόν σφαιρική, μικρότερη από τον κάλυκα.

Περίοδος ανθοφορίας: Ιούνιος-Ιούλιος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη): Σπάνιο (R) σύμφωνα με IUCN 1997

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη): Π.Δ. 67/1981

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 5980

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Greuter, W. 1973. Additions to the flora of Crete, 1938-1972. Ann.Musei Goulandris 1: 15-83

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Strid, A., and Tan, K. 1991. Mountain flora of Greece. Vol.2. Edinburgh.

Turland, N.J., Chilton, L., & J.R. Press. 1993. Flora of the Cretan Area. Annotated Checklist & Atlas. The Natural History Museum. St Edmundsbury Press, Bury St. Edmunds, Suffolk, England.

Tutin, T. G. et al (eds). *Flora Europaea* Vol. 3. p. 226 (as *C. minus* subsp. *idaeum*). Cambridge University Press.

Zaffran J., 1990. *Contributions a la Flore et la Vegetation de la Crete*. Publications de l'Universite de Provence

Σφήκας Γ. 1987. *Αγριολούλουδα της Κρήτης*. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί, Αθήνα. 310 σελ.