

Οικογένεια *Umbelliferae* (*Apiaceae*)

***Bupleurum kakiskalae* Greuter**

Γεωγραφική κατανομή: Δυτ.Κρήτη (Λευκά Όρη)

Ενδημισμός: ενδημικό Κρήτης

Οικότοπος: ΝΑ κρημνοί σε ασβεστούχο πέτρωμα (υψ. 1450-1750 m)

Σύντομη περιγραφή: Πολυετές φυτό, ζει έως και 12 έτη και τον περισσότερο χρόνο της ζωής του παράγει μόνο φύλλα. Τα άγονα άτομα αποτελούνται από έναν ανθεκτικό, μη διακλαδιζόμενο βλαστό πάχους 1 cm ή παραπάνω και περίπου 12 cm μήκους, με έναν ρόδακα με 15-30 πεπλατυσμένα φύλλα μήκους έως 25 cm. Οι γόνιμοι βλαστοί φτάνουν μέχρι 1 m ύψος, σχηματιζόμενοι από τον ρόδακα των προηγούμενων χρόνων, φέροντες μια χαλαρή, ελεύθερα διακλαδιζόμενη φόβη σκιαδίων με 4-6 ακτίνες η καθεμιά. Τα άνθη του είναι μικρά και κίτρινα δίνοντας καρπούς μια φορά μόνο στο τέλος της ζωής του.

Περίοδος ανθοφορίας: Ιούλιος-Αύγουστος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη): Κινδυνεύον (Ε) σύμφωνα με Κόκκινο Βιβλίο Σπανίων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (1995) - Κινδυνεύον (Ε) σύμφωνα με IUCN 1997

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη): Π.Δ. 67/1981, Συνθήκη της Βέρνης, Ευρ.Οδηγία 1992/43 (Παραρτ.ΙΙ*/ΙV)

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 8088, 6176, 6144, 5450, 4820, 4832

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Phitos, D., Strid, A., Snogerup, S., Greuter, W. (eds) 1995. The Red Data Book of rare and threatened plants of Greece. World Wide Fund for Nature. Publish.: K. Michalas S. A. Athens. 528p.

Γεωργίου Κ. & Δεληπέτρου Π. 2001. Απειλούμενα Ενδημικά είδη Χλωρίδας στη Νότια Ελλάδα. Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακό Ταμείο, Μουσείο

Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Κυπριωτάκης Ζ. 1998. Συμβολή στη μελέτη της χασμοφυτικής χλωρίδας της Κρήτης και προτάσεις για τη διαχείριση της ως φυσικού πόρου (φυσιολατρικός τουρισμός, ανθοκομία, εθνοβοτανική κλπ.). Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών. 230 σελ.